

平成30年産 JAいわて花巻「限定純情米」栽培暦

花巻地域

月	3月		4月		5月			6月			7月			8月			9月			10月		11月	
旬	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	
ステージ	出芽・緑化・硬化				活着期			有効分けつ決定期			幼穂形成期(7/13~16頃)			出穂期(8/3~5頃)			登熟期			成熟期(9/20頃~)			
水管理	除草剤散布後は4日以上止め水											中干し			低温時深水管理 高温で経過する場合は、深水にしないでかけ流し								
作業内容	種子準備 種子消毒 種子浸漬 床土準備		催芽・播種 加温出芽・育苗 畦畔補修 耕起		基肥施用 代掻き 田植え 病虫害防除 除草剤散布			取置き苗除去 溝切り 畦畔草刈			深水管理 畦畔草刈 追肥			間断灌溉 カメムシ防除 穂いもち防除			畦畔草刈 落水作業			刈取り 乾燥調整 出荷		有機質・土壌改良資材の散布 秋耕	
管理作業	種子浸漬 積算水温100℃~120℃が目安 浸種日数(10日~12日) プール育苗準備		種子消毒 催芽:ハト胸状態 播種4月15日頃 乾籾重150g/箱 加温出芽長5mm 育苗日数25日2.5葉 畦畔補修 あぜ塗り機 漏水防止 冷害防止と除草剤の効果		育苗:徒長にならないよう 早めの開放 均平に代掻き 適期田植え 植付け本数確保 穂数確保に60株/坪、 4~6本/株植え 除草剤散布 水深に注意			溝切りは、6月末に中干しと併せて行なう 取置き苗は有害なので、6月上旬までに除去 除草剤散布 ホタルイ・クログワイが発生する圃場は防除します			水管理徹底 深水管理 止め葉が出始める頃、低温時は特に深水 畦畔の水漏れに注意 追肥は幼穂形成期 上限は、N 2kg/10a、 出穂後はしない 穂いもち 予防防除の徹底			間断灌溉 出穂後、登熟中期まで水を必要だけかける カメムシ防除 周辺牧草と畦畔の草刈は7月下旬までに終了 薬剤防除は、穂揃7日後			落水作業 早期落水はしない 溝を排水路につなぐ 適期刈取り 出穂後50日前後 穂の80~90%黄色 登熟積算温度950~1050℃ ☆適期刈取り判定シート活用			乾燥調整 二段乾燥の励行 仕上げ水分:15%以下 ふるい目:1.9mm使用 整粒歩合:80%以上		土壌改良剤散布	
安全・安心	生産履歴記帳の開始											栽培管理記録簿の配布											
	生産者チェックシート											12月に「生産者チェックシート」を配布します。水稻の生産工程管理手法に関する項目をチェックし、「安全・安心」への手法を普及します。											
病害虫雑草防除	■いもち病■ 種子消毒 <テクリードC> 県種苗センターにて消毒済みの種子 葉いもち防除 ・箱施用徹底 <Dr.オリゼフェルテラ箱粒剤> 育苗箱施用:50g/箱 基準量の散布を厳守する。 田植え3日前~当日 穂いもち防除 ・予防防除の徹底 <コラトップ> 無人ヘリ:1kg/10a、粒剤:1.5kg/10a ジャンボ剤:10a当たり50g/パック13個		■細菌病・立枯れ病■ ・耕種的防除が基本 ①塩水選 ②催芽30℃ ③加温出芽30℃ ④育苗 ・細菌病を出さないよう温度を上げすぎない。 ・育苗ハウスの開閉をこまめに行い、高温にならないように管理する。 ・かん水は、過かん水にならないように、天候や土の乾きを確認し行う。 ・耕種的防除が基本 ・プール育苗の実践 ・薄播きによる健苗づくり			■紋枯病■ ・代掻き後のゴミあげで菌核除去 ■畦畔草刈■ ・こまめな草刈りでカメムシ被害を減少 重点刈取り時期 ・6月上旬・7月下旬 ■カメムシ防除■ <ダントツ粉剤DL> 3~4kg/10a <ダントツ水溶剤> 4,000倍 60~150ℓ/10a 散布時期 穂揃 7日後			■雑草対策■ ①畦畔塗り ・漏水防止 ②代掻き・ゴミあげ ・均平確保と雑草種子除去(雑草発芽抑制と除草剤効果向上) ③除草剤散布 <アツパレZ> 1キロ粒剤 : 1kg/10a フロアブル : 500ml/10a ジャンボ : 400g/10a <バサグラン> 多年生雑草対策、落水状態使用 粒剤: 3kg/10a(収穫60日前まで) 液剤: 500~700ml/10a(同50日) <クリンチャー> 1キロ粒剤: 1kg/10a(同30日) ジャンボ : 1kg/10a(同40日)			土づくり 「賢治の教え1号・2号」を10a当たり60kg施用します。(磷酸資材は省略できます。) 「早池峰の息吹」を施用した場合は基肥10kgを減らす。 基肥 ひとめぼれ どんびしゃり 愛農土1号 50~60kg 愛農土2号(エルピー肥料) 40~50kg ペースト 30~40kg どんびしゃり専用 50kg 苦土重焼燐又はダブリン特17号 20kg 20kg *「いわてっこ」の施肥量は「ひとめぼれ」と同程度とします。 追肥 NKC-17号又は 6~9kg 10~12kg おてがるくん(流し込み) 8~14kg 10~12kg * 追肥は生育状況、天候に応じて量、時期を調整する。 * 茎・葉が軟弱な場合は、PKマグ40号又はけい酸加里を中干し前に追肥。											